

INTÉGRATION SUR UN SEGMENT

Définition théorique. L'intégrale d'une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ est définie comme la valeur commune de (1) : la borne supérieure de l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier minorant f , et (2) : la borne inférieure de l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier majorant f .

Primitive et Intégrale. Toute fonction continue sur $[a, b]$ y admet une primitive, notée F . $\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$.

Toute fonction de la forme $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$, où $a \in \mathbb{R}$, est une primitive de f s'annulant en a . Si f est continue, F est de classe \mathcal{C}^1 .

Propriétés de l'intégration. f et g sont continues par morceaux sur $[a, b]$.

— **Chasles.** $\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$.

— **Linéarité.** $\int_a^b (\alpha f(t) + \beta g(t)) dt = \alpha \int_a^b f(t) dt + \beta \int_a^b g(t) dt$.

— **Positivité.** Si $a \leq b$: si f est positive, $\int_a^b f(t) dt \geq 0$.

— **Croissance.** Si $a \leq b$: si $\forall t \in [a, b], f(t) \leq g(t)$, alors $\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$.

— **Intégrale nulle.** Si f est continue et positive sur $[a, b]$: $\int_a^b f(t) dt = 0 \Rightarrow \forall t \in [a, b], f(t) = 0$.

Intégration par parties. Si f et g sont de classe \mathcal{C}^1 sur $[a, b]$: $\int_a^b f'(t)g(t) dt = [f(t)g(t)]_a^b - \int_a^b f(t)g'(t) dt$.

Changement de variable.

— " $u = \varphi(t)$ ". Si φ est de classe \mathcal{C}^1 sur $[a, b]$: $\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u) du$.

— " $t = \varphi(u)$ ". Si φ est de classe \mathcal{C}^1 sur $[\alpha, \beta]$, avec $\varphi(\alpha) = a$ et $\varphi(\beta) = b$, alors : $\int_a^b f(t) dt = \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du$.

Sommes de RIEMANN. Si f est continue sur $[a, b]$, alors :

— $s_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(t) dt$.

— $S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(t) dt$.

En particulier pour $a = 0$ et $b = 1$: $\frac{1}{n} \sum_{k=0 \text{ ou } 1}^{n-1 \text{ ou } n} f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(t) dt$.

Valeur moyenne. $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$ est la valeur moyenne de f sur $[a, b]$. $\exists c \in]a, b[$, $\mu = f(c)$.